

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Szanowna Pani

Jestem studentką Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu na kierunku Pielęgniarstwo. Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej pracy magisterskiej na temat: ***Wiedza kobiet zamieszkałych w Elblągu na temat profilaktyki raka szyjki macicy.***

Ankieta jest w pełni anonimowa i będzie służyła celom badawczym przy pisaniu pracy magisterskiej. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety.

.....

METRYCZKA

Wiek:

- ☐ 18-30 lat
- ☐ 40-50 lat
- ☐ 50-60 lat
- ☐ > 60 lat

Wykształcenie:

- ☐ Podstawowe
- ☐ Zawodowe
- ☐ Średnie
- ☐ Wyższe

Czy w Pani rodzinie występują/-owały przypadki nowotworu raka szyjki macicy?

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

U kogo z Pani rodziny zdiagnozowano raka szyjki macicy? (Jeśli nie dotyczy, proszę przejść do kolejnego pytania)

- ☐ Matka
- ☐ Siostra
- ☐ Babcia
- ☐ Inny stopień pokrewieństwa (jaki?).....

Co stanowi źródło Pani wiedzy o profilaktyce raka szyjki macicy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

- ☐ Znajomi, rodzina
- ☐ Telewizja, internet, gazeta, radio
- ☐ Lekarz
- ☐ Pielęgniarka
- ☐ Położna
- ☐ inne (jakie?)

Liczba przebytych porodów?

- ☐ 0
- ☐ 1-2
- ☐ 3 i więcej
- ☐ poronienie (jeśli tak, ile razy?).....

Czy w Pani odczuciu posiada Pani wystarczającą wiedzę na temat profilaktyki raka szyjki macicy?

- ☐ Zdecydowanie tak
- ☐ Raczej tak
- ☐ Raczej nie
- ☐ Zdecydowanie nie
- ☐ Nie mam zdania

PYTANIA

1. Czy palenie papierosów oraz wyrobów nikotynowych ma wpływ na rozwój raka szyjki macicy?

- a) Zdecydowanie ma wpływ na rozwój raka szyjki macicy
- b) Raczej ma wpływ na rozwój raka szyjki macicy
- c) Nie mam zdania
- d) Raczej nie ma wpływu na rozwój raka szyjki macicy
- e) Zdecydowanie nie ma wpływu na rozwój raka szyjki macicy

2. Czy częste zmiany partnerów seksualnych mają wpływ na rozwój raka szyjki macicy?

- a) Zdecydowanie ma wpływ na rozwój raka szyjki macicy
- b) Raczej ma wpływ na rozwój raka szyjki macicy
- c) Nie mam zdania
- d) Raczej nie ma wpływu na rozwój raka szyjki macicy
- e) Zdecydowanie nie ma wpływu na rozwój raka szyjki macicy

3. Czynniki rozwoju raka szyjki macicy są? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

- a) Zakażenie HPV
- b) Palenie tytoniu
- c) Wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego
- d) Duża ilość partnerów seksualnych
- e) Częste stany zapalne pochwy
- f) Wielodzierzność
- g) Stosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych
- h) Nieprawidłowy wynik cytologii
- i) Zakażenie HIV
- j) Choroby dziedziczne (nowotwór piersi lub jajnika)

4. Czy wczesne stadia raka szyjki macicy dają objawy kliniczne?

- a) Zdecydowanie tak
- b) Raczej tak

- c) Nie wiem
- d) Raczej nie
- e) Zdecydowanie nie

5. Jakie są najczęstsze objawy raka szyjki macicy?

- a) Nieregularne miesiączki i nieprawidłowe krwawienia, upławy o nieprzyjemnym zapachu, bóle w podbrzuszu, bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, krwawienia w trakcie i po stosunku seksualnym
- b) Ropno-śluzowe upławy, świąd okolic intymnych, ból w podbrzuszu, pieczenie w trakcie oddawania moczu
- c) Ból podczas oddawania moczu, pollakisuria (parcie na mocz), uczucie pieczenia cewki moczowej, ból podbrzusza, krwimocz, gorączka

6. Rak szyjki macicy daje szybkie objawy choroby?

- a) Zdecydowanie tak
- b) Raczej tak
- c) Nie wiem
- d) Raczej nie
- e) Zdecydowanie nie

7. Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy polega na?:

- a) Szczepienia
- b) Badania profilaktyczne
- c) Zdobywanie wiedzy na temat raka szyjki macicy (edukacja)
- d) Nie wiem

8. Profilaktyka wtórna raka szyjki macicy polega na?:

- a) Szczepienia
- b) Badania profilaktyczne
- c) Zdobywanie wiedzy na temat raka szyjki macicy (edukacja)
- d) Nie wiem

9. Kiedy należy wykonać pierwsze badanie cytologiczne?(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

- a) Nie później niż 3 lata od rozpoczęcia współżycia seksualnego
- b) Między 20- 25 rokiem życia
- c) Po wystąpieniu pierwszej miesiączki
- d) Po wystąpieniu menopauzy
- e) Nie wiem

10. Co ile czasu należy wykonywać badania cytologiczne?

- a) Co 5 lat
- b) co 3 lata
- c) Co 7 lat
- d) Co 2 miesiące
- e) Nie wiem

11. Na czym polega badanie cytologiczne?

- a) Na badaniu palpacyjnym pochwy
- b) Na pobraniu rozmazu z pochwy
- c) Na pobraniu rozmazu z szyjki macicy
- d) Nie wiem

12. W którym dniu cyklu menstruacyjnego należy wykonać badanie cytologiczne?

- a) Między 1-5 dniem (w czasie trwania miesiączki)
- b) Między 6-14 dniem (pomiędzy miesiączką a owulacją)
- c) Między 15-28 dniem cyklu (po owulacji)
- d) Nie wiem

13. Czy Pani zdaniem cytologia jest bolesna?

- a) Zdecydowanie tak
- b) Raczej tak
- c) Nie wiem
- d) Raczej nie
- e) Zdecydowanie nie

14. Dlaczego Pani zdaniem znaczna część kobiet nie poddaje się profilaktycznej cytologii? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

- a) Kobiety obawiają się, że badanie jest bolesne
- b) Kobiety boją się wyniku badania
- c) Kobiety wstydzą się wykonywać tak intymne badania
- d) Kobiety nie czują potrzeby wykonywania takich badań
- e) Nie wiem

15. Czym jest HPV?

- a) Pasożytem
- b) Bakterią
- c) Wirusem brodawczaka ludzkiego
- d) Grzybem
- e) Nie wiem

16. Czy osoby zakażone wirusem brodawczaka ludzkiego mogą się przeciwko niemu zaszczepić?

- a) Tak, gdyż szczepienie daje ochronę przed innymi typami wirusa
- b) Nie, gdyż może to prowadzić do nasilenia przebiegu zakażenia
- c) Wirus znajduje się już w organizmie, więc szczepienie nie jest potrzebne
- d) Nie wiem

17. Czy zaszczepienie przeciwko HPV daje trwałą i całkowitą odporność przeciwko zakażeniu się wirusem brodawczaka ludzkiego?

- a) Zdecydowanie tak, jednorazowo wykonane szczepienie daje trwałą i całkowitą odporność przed zachorowaniem
- b) Szczepienie składające się z trzech dawek leku należy powtarzać co około 8 lat i daje wysokie, lecz nie stuprocentowe prawdopodobieństwo przed zachorowaniem
- c) Szczepienie należy wykonywać co roku i daje całkowitą i trwałą odporność przed zachorowaniem
- d) Nie wiem

18. Prezerwatywa:

- a) Całkowicie zabezpiecza przed zakażeniem wirusem HPV
- b) Ogranicza ryzyko zakażenia HPV, lecz go nie eliminuje
- c) Nie zabezpiecza przed zakażeniem wirusem HPV